1 重積分の変数変換

E を (x, y) 平面上の面積確定有界閉集合, f を E 上の連続関数とすると, 重積分 $\iint_E f(x, y) dx dy$ が定まる. これを変数変換によって計算したい.

次のような $\Phi: U \rightarrow V$ がとれたとする.

- U は (u, v) 平面の領域, V は (x, y) 平面の領域で $E \subset V$.
- 写像 $\Phi: U \rightarrow V$ は全単射, C^1 級, そのヤコビ行列式は 0 にならない.
すなわち $\Phi(u, v) = (\varphi(u, v), \psi(u, v))$ とするとき $\varphi(u, v), \psi(u, v)$ が C^1 級で

$$J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0, \quad (\forall (u, v) \in U)$$

定理 このとき $D = \Phi^{-1}(E)$ とおくと, 次が成り立つ.

$$\iint_E f(x, y) dx dy = \iint_D f(\varphi(u, v), \psi(u, v)) |J(u, v)| du dv.$$

特別の場合として

$$(E \text{ の面積}) = \iint_E dx dy = \iint_D |J(u, v)| du dv.$$

例 1. 線形写像 $\Phi: (u, v) \mapsto (x, y) = (au + bv, cu + dv)$, $J_\Phi(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = ad - bc$.

2. 極座標変換 $\Phi: (r, \theta) \mapsto (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$, $J_\Phi(r, \theta) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = r$.

* n 重積分についても同様の変数変換公式が成り立つ. 空間極座標変換

$$\Phi: (r, \theta, \phi) \mapsto (x, y, z) = (r \sin \theta \cos \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \theta)$$

のヤコビ行列式は $J(r, \theta, \phi) = \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \theta, \phi)} = r^2 \sin \theta$.

2 広義積分

重積分の概念を, 一般の (有界とは限らない) 集合 E や, (有界とは限らない) 関数 f の場合に拡張する.

定義 次のような集合列 $\{K_n\}_{n=1}^\infty$ を E の近似列という.

- 各 K_n は面積確定な有界閉集合.
- $\{K_n\}$ は増大列 ($K_1 \subset K_2 \subset \dots$) で $\bigcup_{n=1}^\infty K_n = E$.
- E に含まれる任意の有界閉集合 L に対して, $L \subset K_n$ となる番号 n が存在する.

例 (1) $K_n = \{x^2 + y^2 \leq n^2\}$, $(n = 1, 2, \dots)$ は $\mathbf{R}^2$ の近似列.

(2) $K'_n = \{\max(|x|, |y|) \leq n\}$, $(n = 1, 2, \dots)$ も $\mathbf{R}^2$ の近似列.

(3) $K_n = \{\frac{1}{n^2} \leq x^2 + y^2 \leq 1\}$, $(n = 2, 3, \dots)$ は $E = \{0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$ の近似列.

定義 E 上の連続関数 f が E で広義重積分可能であるとは, E の任意の近似列 $\{K_n\}_{n=1}^{\infty}$ について $\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{K_n} f(x, y) dx dy$ が存在し, この極限が近似列のとり方によらないことをいう. この極限値を $\iint_E f(x, y) dx dy$ で表わす.

定理 f が E で広義重積分可能 $\iff$ ある近似列 $\{K_n\}$ について $\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{K_n} |f(x, y)| dx dy$ が存在する.

3 ガンマ関数とベータ関数

定義 ガンマ関数を次の広義積分で定義する.

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} e^{-x} x^{s-1} dx \quad (s > 0).$$

$x = t^2$ で変数変換すれば

$$\Gamma(s) = 2 \int_0^{\infty} e^{-t^2} t^{2s-1} dt.$$

定理 (1) $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$ ($s > 0$)

(2) $\Gamma(1) = 1$. n が整数 ≥ 1 のとき $\Gamma(n) = (n-1)!$.

(3) $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$. n が整数 ≥ 1 のとき $\Gamma(n + \frac{1}{2}) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}$.

定義 ベータ関数を次の広義積分で定義する.

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx, \quad (p, q > 0)$$

$x = \sin \theta$ で変数変換すれば

$$B(p, q) = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2p-1} \theta \cos^{2q-1} \theta d\theta$$

定理 (B 関数と Γ 関数の関係)

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

演習

1 重積分の値を求めよ :

$$(1) \quad \iint_E x \, dx dy, \quad E = \{(x, y) \mid 0 \leq x + y \leq 2, 1 \leq 3x - 2y \leq 3\}$$

$$(2) \quad \iint_E \sqrt{1 - x^2 - y^2} \, dx dy, \quad E = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq x\}$$

2 空間極座標変換によって次の3重積分の値を求めよ.

$$\iiint_V z \, dx dy dz \quad V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$$

3 広義積分

$$\iint_E \frac{dx dy}{(x^2 + y^2)^\alpha}, \quad E = \{(x, y) \mid 0 < x^2 + y^2 \leq 1\}$$

が存在するために α が満たすべき条件を求めよ. またそのときの広義積分の値を求めよ.

4 $f(x)$ を閉区間 $[a, b]$ で連続な関数とする. $[a, b]$ 上の関数 $f_n(x)$, ($n = 0, 1, 2, \dots$) を

$$f_0(x) = f(x), \quad f_n(x) = \int_a^x f_{n-1}(t) \, dt \quad (n = 1, 2, \dots)$$

で定める (n 次原始関数). このとき

$$f_n(x) = \int_a^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f(t) \, dt \quad (n = 1, 2, \dots)$$

であることを示せ. (1変数微積分の範囲でできる (教科書 112 頁) が, ここでは $f_n(x)$ が n 重積分で表わせることを用いてみよ.)

5 次のような平面上の集合列 $\{K_n\}_{n=1}^\infty$ の例をつくれ :

(i) 各 K_n は有界閉集合.

(ii) $\{K_n\}$ は増大列で $\bigcup_{n=1}^\infty K_n = \mathbf{R}^2$.

(iii) 有界閉集合 L で, どの K_n にも含まれないものが存在する.

宿題

1月24日(火) 11:00 までに、全学共通科目レポートボックスに提出

1 重積分の値を求めよ

$$(1) \quad \iint_E (x^2 + y^2) dx dy, \quad E = \left\{ (x, y) \mid \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1 \right\}$$

$$(2) \quad \iint_E \tan^{-1} \frac{y}{x} dx dy, \quad E = \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2, x \geq 0, y \geq 0 \}$$

2 次の広義積分の値を求めよ：

$$\iint_E x^2 e^{-x^2-y^2} dx dy, \quad E = \{ (x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0 \}$$

3 次の広義積分が収束するような α の範囲を求めよ。またそのときの積分の値を求めよ：

$$\iint_E \frac{y^2}{(x^2 + y^2)^\alpha} dx dy, \quad E = \{ (x, y) \mid x^2 + y^2 \geq 1 \}$$

4 半径 R の円に糸を巻きつけて、ゆるむことなくほどく。このとき糸の先端が描く曲線を円の伸開線 (インボリュート) という。これは次式で与えられる。

$$\begin{cases} x = R(\cos \theta + \theta \sin \theta) \\ y = R(\sin \theta - \theta \cos \theta) \end{cases}$$

図における角 θ が 0 から α ($0 < \alpha < 2\pi$) まで動くとき、糸が通過する範囲の面積を求めよ。

(ヒント) 次の変数変換 $(t, \theta) \mapsto (x, y)$ を考える：

$$\begin{cases} x = R \cos \theta + t \sin \theta \\ y = R \sin \theta - t \cos \theta \end{cases}$$